




## COPROCULTURE TOXINE CLOSTRIDIUM DIFFICILE VIRUS



⇒ **Les 2 conditionnements doivent être acheminés au laboratoire**

### Intérêt :

Mise en évidence d'agent responsable d'une diarrhée infectieuse.

### Préconisations pour le prélèvement :

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement, avec un régime sans résidu la veille du recueil.

- Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
- Identifier le flacon et l'écouvillon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.
- Mode opératoire pour l'écouvillon :
  - Prélever une petite quantité de selles en introduisant complètement le tampon floqué dans l'échantillon de matières fécales et en faisant tourner la pointe du tampon
  - Sélectionner les parties de selles qui présentent des traces de sang, de muqueuses ou eau.
  - S'assurer de la présence de matières fécales visibles sur la pointe de l'écouvillon
  - Après le prélèvement, transférer le tampon dans le tube contenant le milieu de conservation et s'assurer visuellement que la ligne de remplissage maximal (3MAX FILL ») indiquée sur l'étiquette n'est pas dépassée.
  - En tenant la tige de l'écouvillon, mélanger contre les parois du tube de façon à distribuer et à suspendre de manière uniforme l'échantillon.
  - Rompre le tampon à l'intérieur du tube en cassant la tige au niveau du point de rupture (ligne colorée).
  - Positionner le bouchon à vis sur l'éprouvette et fermer.
  - Agiter le tube pour homogénéiser



## PARASITOLOGIE DES SELLES



**Important :** indiquer d'éventuels voyages en zones intertropicales

- **Trois recueils** de selles doivent être effectués sur une période de 10 jours environ (ceci permet d'optimiser la sensibilité du test).
- Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
- Identifier le flacon et l'écouvillon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.
- Chaque recueil est à acheminer dans les 3 heures au laboratoire.

## RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES



**Important :** ne pas prélever en cas de crise hémorroïdaire, de prise de laxatif ou d'aspirine ou d'anti-inflammatoire non-stéroïdiens et au cours de la période menstruel.

- Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
- Identifier le flacon et l'écouvillon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.
- Chaque recueil est à acheminer dans les 2-3 heures au laboratoire.

Le recueil de selles **trois jours de suite** permet d'augmenter la sensibilité de cette recherche.